

# **ECKE**

## **Brilliant Red**



# Vaso 17

2012

serra  
(T media)

invaso  
sett.27



2013

serra  
(T media)

invaso  
sett.27



# Vaso 14

2012

Invaso sett.31



tunnel

T media

T molto bassa

2013

Invaso sett.31



tunnel

T media

T bassa

2014



Vaso 17

serra  
(T media)

Invaso  
sett.27

Vaso 14

tunnel  
(T media)

Invaso  
sett.31



# maturazione 2012

- Sett. 42



**T media**

**T molto bassa**

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.51



# maturazione 2013

•Sett.42



•Sett.45



**T media**

**T bassa**

•Sett.48



•Sett.51



# maturazione 2014

## T media

•Sett.42



•Sett.45



•Sett.48



•Sett.51



# Vaso 10 spuntato

2012 Serra (T media)  
invaso sett. 34



Sett.42



Sett. 45



Sett.51

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-forte, ma con crescita graduale e molto regolare. Produce molti rami, ma scarsa ramificazione secondaria. Il portamento è a V, la legatura dei rami nelle taglie grandi è comunque utile, data la forte ramificazione, per favorire una struttura armoniosa.
- **FIORITURA:** media precocità, infiorescenze numerose, regolari, ben portate, di colore rosso intenso. Ciazii grandi e numerosi, ad apertura tardiva.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** buona risposta alla coltivazione a bassa T, anche nei test più drastici (2012), anche se con brattee di dimensioni ridotte. Le brattee mature sono sensibili alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** in un piccolo test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato una discreta tenuta delle brattee, meno soddisfacente quella delle foglie.
- **NOTE:** varietà molto affidabile per la regolarità e omogeneità, e di sicuro effetto estetico, adatta a tutte le taglie testate e di facile coltivazione anche con scarso uso di nanizzanti. Data la tendenza a ramificare molto, si consiglia di lasciare, alla cimatura, un numero limitato di nodi. Si adatta bene ad un moderato abbassamento della T di coltivazione, se ne consiglia comunque la coltivazione in strutture in cui sia controllabile l'Ur.