

Red Fox

Bravo Bright Red



Vaso 17

2011

serra
(T media)

invaso
sett.28



2012

serra
(T media)

invaso
sett.28



Vaso 17

2013

serra
(T media)

invaso
sett.27



2014

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 14

2011

Invaso sett.31



tunnel

T media



T bassa

2012

Invaso sett.31



tunnel

T media

T molto bassa

Vaso 14

2013

Invaso sett.31



tunnel

T media

T bassa

2014

Invaso sett.31




tunnel

T media

T bassa

maturazione 2012

•Sett.42



T media

T molto bassa

•Sett.45



•Sett.48



•Sett.51



maturazione 2013

•Sett.42



•Sett.45



T media

T bassa

•Sett.48



•Sett.51



maturazione 2014

•Sett.42



•Sett.45



T media

T bassa

•Sett.48



•Sett.51



Vaso 10 spuntato

2012

Serra (T media)

invaso sett. 34



Sett.42

Sett. 45



Sett.51

RISULTATI PROVE DURATA*

- fine gennaio – 2010



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg

da serra



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg

* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede del 2010

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, portamento dei rami leggermente aperto. Nel vaso 17, in cui cresce molto in larghezza, è consigliabile la legatura dei rami.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze grandi e orizzontali, di colore rosso brillante. Ciazii numerosi, grandi e durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** risponde bene a un moderato abbassamento della T, in condizioni difficili manifesta schiarimenti fogliari. La brattea matura è, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibile alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** discreta tenuta, soprattutto delle brattee.

•**NOTE:** varietà che colpisce soprattutto per le caratteristiche estetiche delle infiorescenze, ha crescita uniforme e regolare con scarso o nessun impiego di nanizzanti, soprattutto sui vasi medio-piccoli ai quali appare più adatta.

Meno affidabile nelle taglie grandi, dà comunque un discreto risultato ove non siano richieste piante molto alte.