

Red Fox

Bella Italia



Vaso 17

2011

serra
(T media)

invaso
sett.28



2012

serra
(T media)

invaso
sett.28



Vaso 17

2013

serra
(T media)

invaso
sett.27



2014

serra
(T media)

invaso
sett.27



Vaso 14

2009

invaso sett.31



serra (T media)



tunnel (T molto bassa)

2012

invaso sett.31



Tunnel (T media)

(T molto bassa)

Vaso 14

2013

invaso sett.31



Tunnel

(T media)

(T bassa)

2014

invaso sett.31



Tunnel

(T media)

(T bassa)

maturazione 2012



- Sett. 42

T media

T molto bassa

- Sett.45



- Sett.48



- Sett.51



maturazione 2013

- Sett. 42



- Sett.45



T media

T bassa

- Sett.48



- Sett.51



maturazione 2014

- Sett. 42



- Sett.45



T media

T bassa

- Sett.48



- Sett.51



RISULTATI PROVE DURATA*

• Fine gennaio – 2009



da serra (a sx posizione più luminosa)



Da tunnel

• Fine gennaio-2010

da serra



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg

da tunnel



non insacchettata

ins. 4 gg

ins. + inscatolata 10 gg

* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

Vaso 10 spuntato

2012 Serra (T media)
invaso sett. 34



Sett.42



Sett. 45



Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** molto vigorosa, anche se talvolta un po' lenta nelle fasi iniziali. Produce rami robusti con portamento non a V naturale, ottenibile però con la gestione della spaziatura. La legatura dei rami può essere comunque utile. Molto più frequente l'allargatura di qualche ramo basale nei vasi piccoli a causa delle dimensioni delle brattee.
- **FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze molto grandi, assurgenti se coltivata a bassa T. Ciazii non numerosi ma grandi a maturazione molto tardiva rispetto alla colorazione, molto duraturi.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** con 16° in novembre e fino a 14° in dicembre, ottimo risultato, con brattee di un rosso più intenso e ben sviluppate. Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibili alla botrite.
- **TRASPORTO/DURATA:** ottima tenuta sia delle brattee che delle foglie. Botrite sulle brattee più interne solo dopo insacchettamento prolungato.
- **NOTE:** varietà particolarmente adatta a vasi grandi che ne valorizzano la vigoria e la fioritura appariscente, non soffre la densità e risponde bene ad un moderato abbassamento della T. Ottima la durata, soprattutto per la tenuta delle foglie.